

RX140

VERSÁTIL PARA MANEJO
DE DOENÇAS DE SOLO

Benefícios:

Manejo de plantas daninhas

Permite a utilização de herbicidas para manejo de plantas daninhas de folhas largas.



Diversidade de espécies equilibrada

Palhada duradoura e equilibrada, que protege o solo e auxilia no manejo de doenças da próxima safra.



Eficaz no manejo de doenças do solo

Promove a supressão de *Fusarium*, *Rhizoctonia* e demais doenças de solo.



Características:

CURTO

MÉDIO

LONGO

Ciclo: 50 a 70 dias¹

Ambiente de produção: Todos

Índice de MS: 20 - 22%

Relação C/N: > 20

Faixa de Dosagem: 40 - 52 Kg/ha


¹Ciclo varia conforme manejo e a época de semeadura.

Composição do mix:

- Centeio IPR 89
- Aveia Branca IPR Esmeralda
- Aveia Preta Embrapa 139
- Aveia Ucraniana AF 1340
- Milheto BRS 1501
- Sorgo BRS Ponta Negra



Ciclagem de Nutrientes



Fonte: Pesquisa e Inovação, Raix BioSoluções 2025.

Painel de Resultados do RX 140



Média de resultados de **RX 140** em relação à média da testemunha: Aveia AF 1340, Centeio IPR 89 e Milheto BRS 1501.

CARACTERÍSTICA	RESULTADOS
Produção de Massa Seca	+71%
Ciclagem de Nutrientes Macronutrientes	+84%
Ciclagem de Nutrientes Micronutrientes	+135%

PIMM

Planejamento e Implantação:

Época recomendada de semeadura: **Março a Agosto** | Profundidade de semeadura: **2 a 3 cm**

Sugestão de dose para semeadura:

Linha - kg/ha			Lanço - kg/ha		
Ambiente de Produção Alto	Ambiente de Produção Médio	Ambiente de Produção Baixo	Ambiente de Produção Alto	Ambiente de Produção Médio	Ambiente de Produção Baixo
40	45	48	48	50	52

Monitoramento: Lagartas e vaquinhas.

Doenças: Ferrugem da folha.

Manejo final do produto:

Manejo

Dessecação total: Recomenda-se realizar a dessecação total e/ou manejo com rolo faca em pleno início do florescimento das espécies ou 30 a 40 dias antes da semeadura da cultura comercial, ou conforme a tabela ao lado:

¹Dessecação – refere-se a dessecação com utilização de herbicidas e com condições climáticas favoráveis

Produção de MS (t/ha)	Intervalo entre o manejo do mix até a semeadura da cultura comercial	
	Dessecação ¹	Dessecação ¹ + Rolo - faca
< 6	20 dias	18 dias
< 6	30 dias	25 dias