

RX TROPEIRO

NUTRIÇÃO QUE CONDUZ SEU REBANHO A MAIS GANHO E RENTABILIDADE.

Benefícios:

Elevada qualidade Bromatológica

Pastagem de qualidade para o rebanho.



Pastejo e Pré-Secado

Composição estratégica de gramíneas que aumenta a versatilidade no campo.



Excelente relação Folha/colmo

Entregando elevada digestibilidade.



Características:

CURTO

MÉDIO

LONGO

Ciclo: 90 a 120 dias¹

Ambiente de produção: Todos

Índice de MS: 12 - 15%

Relação C/N: > 20

Faixa de Dosagem: 45 - 60 kg/ha

¹Ciclo varia conforme manejo e a época de semeadura.


Composição do mix:

- Aveia Preta Embrapa 139;
- Aveia Preta IPR 61;
- Aveia Branca IPR Afrodite;
- Aveia Branca IPR Esmeralda.



Raix
NUTRIÇÃO
ANIMAL

Massa Seca Pastejo



Fonte: Pesquisa e Inovação, Raix BioSoluções.

Painel de Resultados do RX Tropeiro



Média de resultados de **RX Tropeiro** em relação à média da testemunha: Aveia Preta Embrapa 139.

CARACTERÍSTICA	Aveia Preta Embrapa 139	RAÍX
Produção de Biomassa (t/ha)	30,51	49,38
Produção de Massa Seca Pastejo (t/ha)	4,80	6,20
Proteína Bruta (%MS)	16,20	18,20
Fibra em Detergente Neutro - FDN (%MS)	49,10	48,70
Fibra em Detergente Ácido - FDA (%MS)	29,80	28,40
Nutrientes Digestíveis Totais (%MS)	68,80	72,90
Relação Folha/colmo	1,50	2,60

PIMM Planejamento e Implantação:

Época recomendada de semeadura: **Março a Junho** Profundidade de semeadura: **2 a 3 cm**

Sugestão de dose para semeadura:

Pastejo: **Cobertura:**

Linha - kg/ha		Linha - kg/ha		Lanço - kg/ha	
Ambiente de Produção Alto/Médio	Ambiente de Produção Baixo	Ambiente de Produção Alto/Médio	Ambiente de Produção Baixo	Ambiente de Produção Alto/Médio	Ambiente de Produção Baixo
55	60	45	50	50	60

Monitoramento: Lagartas e pulgões.

Manejo final do produto: Manejo 01

Pastejo:

- Recomenda-se iniciar quando a pastagem atingir 30 cm de altura.
- A altura de saída deve ser, no mínimo, de 15 cm.
- A partir do terceiro corte, a altura de saída mínima passa a ser de 20 cm.
- Recomenda-se realizar aplicação de N após o primeiro corte.

Pré-secado:

- Para a produção do pré-secado, recomenda-se que a colheita ocorra entre a emissão da panícula e o estágio de grão leitoso médio das espécies do RX Tropeiro.

Manejo 02

Dessecação total: Recomenda-se realizar no pleno florescimento da Aveia Branca IPR Afrodite e/ou Aveia Preta Embrapa 139, ou conforme a tabela ao lado:

¹Dessecação – refere-se a dessecação com utilização de herbicidas e com condições climáticas favoráveis

Produção de MS (t/ha)	Intervalo entre o manejo do mix até a semeadura da cultura comercial	
	Dessecação ¹	Dessecação ¹ + Rolo - faca
< 5	30 dias	25 dias
5 - 6	35 dias	30 dias
> 6	45 dias	40 dias