

RX 420

**RÁPIDA LIBERAÇÃO
DE NUTRIENTES**
permitindo a semeadura
antecipada

Benefícios:

Elevado aporte de N

+150% em relação à média das testemunhas (Crotalaria spectabilis e milheto).



Composição estratégica

Não apresenta gramíneas em sua composição, logo, facilita o manejo químico de gramíneas de difícil controle.



Baixa relação C/N

Permite a semeadura antecipada após o manejo do mix.



Características:

CURTO

MÉDIO

LONGO

Ciclo: 60 a 90 dias¹

Ambiente de produção: Todos

Índice de MS: 16 - 18%


Relação C/N: < 20

Faixa de Dosagem: 20 - 33 Kg/ha

¹Ciclo varia conforme manejo e a época de semeadura.

Composição do mix:

- Trigo Mourisco IPR 92
- Crotalaria ochroleuca
- Nabo Forrageiro IPR 116
- Nabo Japonês Minowase
- Feijão Guandu Anão IPR 43
- Crotalaria spectabilis



Fonte: Pesquisa e Inovação Raíx 2024.

Painel de Resultados do RX 420



Média de resultados de **RX 420** em relação à média das testemunhas de *Crotalaria spectabilis* e Milheto.

CARACTERÍSTICA

Produção de Massa Seca

+86%

Ciclagem de Nutrientes

+69%

Diversidade Biológica

+46%

Capacidade de Armazenagem Hídrica

+15%

PIMM

Planejamento e Implantação:

Época recomendada de semeadura: **Setembro a Março** | Profundidade de semeadura: **2 a 3 cm**

Cerrado | Sugestão de dose para semeadura:

Linha - kg/ha		Lanço - kg/ha		
Ambiente de Produção Alto/Médio	Ambiente de Produção Baixo	Ambiente de Produção Alto	Ambiente de Produção Médio	Ambiente de Produção Baixo
20	25	25	30	33

Sul | Sugestão de dose para semeadura:

Linha - kg/ha		Lanço - kg/ha	
Ambiente de Produção Alto/Médio	Ambiente de Produção Baixo	Ambiente de Produção Alto/Médio	Ambiente de Produção Baixo
20	23	25	30

Monitoramento:

Lagartas, vaquinhas, percevejos e pulgões.

Manejo final do produto:

Manejo

Dessecação total: Recomenda-se realizar no pleno florescimento do Trigo Mourisco IPR 92 e/ou Nabo Forrageiro IPR 116. Após 48h recomenda-se o manejo mecânico com rolo-faca ou conforme tabela abaixo:

Produção de MS (t/ha)	Intervalo entre o manejo do mix até a semeadura da cultura comercial	
	Dessecação ¹	Dessecação ¹ + Rolo - faca
< 6	20 dias	15 dias
6 - 8	25 dias	20 dias
> 8	30 dias	25 dias

¹Dessecação – refere-se a dessecação com utilização de herbicidas e com condições climáticas favoráveis